

## **LA RAZA CARORA: EXPRESIÓN CULTURAL DECLARADA PATRIMONIO NACIONAL**

Líldo Ramírez. Universidad de Los Andes – Trujillo. Venezuela. [lilidor@ula.ve](mailto:lilidor@ula.ve)

No existían los bovinos en América; ellos fueron introducidos por Cristóbal Colon en su segundo viaje, realizado en 1493, cuando fueron llevados a la isla de Santo Domingo (La Española); desde ahí fueron traídos a Venezuela, encontrándose para el año 1546 unas 300 vacas en la región de El Tocuyo. El ganado criado en Venezuela desde entonces se conformó por el cruce indiscriminado de las razas Retinta, Rubia, Negra y Berrenda de Andalucía, la Pirenaica, Murciana, Tudanca y Gallega, originarias de España, exhibiendo ese ganado (Criollo) una variedad de colores, formas, productividad y características. Desde el Tocuyo, Quíbor y Coro estos bovinos fueron llevados a Carora. Hasta el inicio del siglo XX no hubo introducción significativa al país de otras razas. En 1892 se introduce el alambre de púas. A partir de 1914 comienza un periodo de mejoramiento, con la importación de animales de otras razas como el Cebú, Holstein, Pardo Suizo y Jersey, y se diseñan planes de desarrollos pecuarios y lecheros. En 1953 se inicia el plan de mestización de rebaño nacional con el ganado Cebú.

### **La Raza Carora.**

La ciudad de Nuestra Señora de la Madre de Dios de Carora, fue fundada en el mes de septiembre de 1569, en la zona donde habitaban las tribus Ajaguas y Caquetios; los fundadores de esta ciudad provenían de El Tocuyo, región esta última que fue núcleo de difusión de la ganadería en el occidente del País. La región de origen de la raza pertenece al municipio Torres del estado Lara. Ella está atravesada por varios ríos: Tocuyo,

Curarigua, Morere, Diquiva, Quediche, Los Bucares y el Sicare (Misoa). Es una región semidesértica, con vegetación xerófila; la época de lluvia abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre; con lluvias esporádicas el resto del año, exhibe un paisaje de lomas y hondonadas con quebradas, con una precipitación anual inferior a 1100mm y una temperatura media anual de 18 a 24 °C.

En la década del 20 los ganaderos comenzaron a seleccionar, por sus características lecheras, el ganado Criollo de la zona denominada Amarillo de Quebrada Arriba; mejoraron la infraestructura pecuaria y cultivaron pastos de mejor calidad que los naturales, desarrollándose un pujante industria quesera artesanal; a objeto de incrementar la producción y productividad emprendieron un audaz plan de absorción e introdujeron ejemplares, importados de Europa y Estados Unidos, de la raza Pardo Suizo hasta lograr un animal adaptado a la región pero más productivo que el Criollo, el cual se conoció como Tipo Carora. Para consolidar sus esfuerzos, en la década del 60 fundaron la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Tipo Carora y establecieron un reglamento para el registro de la raza en formación, definieron el patrón racial y reconocieron el carácter dinámico del proceso de formación, anunciando que en el camino se harían las modificaciones y ajustes necesarios. En el año 1989 el Ministerio de Agricultura y Cría reconoció oficialmente la raza y autorizó a la Asociación para llevar a sus propias expensas los registros genealógicos. A partir de 1992 se profundizó la selección de los animales y se iniciaron una serie de

proyectos destinados a la consolidación de la raza; para ello crearon el banco de datos de la raza, organizaron la información histórica genealógica, productiva y reproductiva, definieron metas genéticas y organizaron las pruebas de progenie; iniciaron evaluaciones sobre las características fisiológicas y de adaptabilidad de la raza al medio con el objetivo de lograr: un animal bien adaptado al clima tropical, buen productor de leche, aun en condiciones de manejo semiextensivo. La raza es genéticamente homogénea y estable y en condición de absorber otras poblaciones. En el año 1998 celebraron con júbilo el haber llenado los requisitos para declarar Toro Probado a un ejemplar de la Raza. Esta raza es, tal vez, la más importante expresión cultural de la región.

#### Algunos indicadores.

La raza Carora se ha difundido a otras regiones del país y del continente, particularmente a Colombia. Actualmente son varios miles los ejemplares puros y de alto mestizaje registrados; su soporte racial se basa en el estudio de 50.428 genealogías, 122.628 lactancias y 440.096 pesadas mensuales de leche. Observándose el primer parto, entre los 28 a 33 meses de edad, una producción promedio da 3.090 kg de leche en 305 días. Datos sobre un rebaño lechero mestizo con predominancia Carora a pastoreo con suplementación durante el ordeño, ubicado en Trujillo, se presentan en la Tabla 1.

**Tabla 1. -CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS-REPRODUCTIVAS DE UN REBAÑO LECHERO CON PREDOMINANCIA DE LA RAZA CARORA,**

<i>Característica</i>	<i>Primíparas</i>	<i>Secundíparas</i>
<b>Edad al parto (m)</b>	35,2	48,4
<b>Peso al parto (kg)</b>	390	419
<b>Producción láctea por:</b>		
- Lactancia (kg)	2.695	2.736
- Día de lactancia (kg/d)	10,1	10,8
- Ajustada a 305 días (kg)	3.082	3.293
- Día de Interparto (kg/d)	7,65	7,94
<b>Intervalo parto a:</b>		
- Involución uterina (d)	29	30
- Primer celo posparto (d)	65	73
Condición corporal al parto	3,1	3,1

**EN TRUJILLO, VENEZUELA.**

#### Nuevos retos.

La ASOCRICA, apoyada en los caracteres de rusticidad, precocidad, fertilidad y el rápido crecimiento exhibido por la Raza se propone abordar el nuevo milenio con los objetivos de: 1) mantener y proteger la raza como alternativa para la explotación especializada de leche. 2) Proponerla como una alternativa para la ganadería de Doble Propósito. 3) Fortalecer la investigación genética, productiva, reproductiva, fisiológica y conductual. 4) Apoyar al ganadero en los aspectos organizativos, informativos y tecnológicos de la explotación de la Raza.

La ASOCRICA cuenta con la Fundación Ganado Carora "Carlos Herrera Zubillaga"

(FACAHEZ) cuyo objetivo es la consolidación de la Raza y un Centro de Inseminación Artificial que funciona como centro genético que ejecuta las labores de extracción, congelación, almacenamiento y distribución de semen para los ganaderos en todo el país. El cuerpo directivo de ASOCRICA está dirigido por el Lic. Mario J. Oropeza Y (Presidente) y el TSU Julio Cesar Alvarez (Gerente General) Teléfono: 052-215945/ 217710 E-mail: [aso200@cantv.net](mailto:aso200@cantv.net)

**\* Referencias.**

- Ramírez I. Lílido N. 1995. "Factores que afectan el período vacío en vacas Carora y Mestizas". En: **Manejo de la Ganadería Mestiza de Doble Propósito**. Editores: Ninoska Madrid-Buri y Eleazar Soto Belloso. Ediciones Astro Data S.A. Maracaibo, Venezuela. Pag. 465-485.
- José E. Guzmán Pérez. 1988. **Producción de leche en los trópicos**. Ed. ESPASANDE. SRL. Caracas. Venezuela.
- **Revista ASOCRICA**. 1999. Año 8. No. 22. Pag: 15-23.

